

Орнитоз

- острая зоонозная инфекция

группы



Заражение людей орнитозом происходит при общении с больными птицами, носителями

Возбудитель орнитоза во внешней среде сохраняется до 2-3 недель.

Инкубационный период колеблется от 6 до 17 дней.

Типичная форма орнитоза развивается остро - среди полного здоровья и хорошего са



На 2-4 день болезни появляются признаки поражения легких - сухой кашель, иногда

В конце первой недели у больных увеличивается печень и селезенка



При тяжелых и среднетяжелых формах орнитоза полное восстановление сил наступает лишь через 2-3 месяца. У некоторых больных заболевание может принять хроническое течение.

Лечение назначается только врачами соответствующей специальности.

Эффективной вакцины для профилактики орнитоза не существует. Применяют антибиотики: макролиды, римфампицин. Сульфаниламидные препараты не эффективны.

Иммунитет после перенесенного заболевания нестойкий, возможны повторные заболевания.



Заболеваемость орнитозом зарегистрирована в трех субъектах Российской Федерации.

Профилактика орнитоза у людей предусматривает борьбу с орнитозом среди домашних птиц, регулирование численности голубей, ограничение контакта с ними. На птицефермах и предприятиях, занимающихся переработкой пера и пуха, необходимо проводить санитарно-ветеринарные мероприятия. При ввозе в страну птиц (особенно попугаев и др. декоративных птиц) следует применять карантинные меры.