

Об эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся клещами

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области продолжает проведение оперативного мониторинга по клещевым инфекциям.

Для инфекций, передающихся иксодовыми клещами, характерна весенне-осенняя сезонность с апреля по октябрь.

Группами риска заболевания инфекциями, передающимися иксодовыми клещами, являются жители городской и сельской местности, посещающие природные биотопы или проживающие на территории антропогенных очагов.

Среди профессиональных групп наибольшему риску заражения инфекциями, передающимися клещами, подвержены лица, занятые в сельскохозяйственной, гидромелиоративной, строительной, заготовительной, промысловой, геологической, изыскательской, экспедиционной, дератизационной, дезинсекционной, озеленительной, лесозаготовительной деятельности.

В лечебно-профилактические организации области за медицинской помощью по поводу укуса клещами на 19.07.2022 обратилось 3463 человека, из них 1299 - дети до 14 лет (на уровне многолетних данных).

В области зарегистрировано 22 лабораторно подтвержденных случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (г. Новошахтинск, Пролетарский, Сальский, Октябрьский, Ремонтненский, Тацинский, Зимовниковский, Целинский, Орловский, Дубовский, Морозовский, Кагальницкий, Аксайский районы); 7 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (гг. Ростов-на-Дону, Азов (завозной), Таганрог, Шахты), 20 случаев заболевания коксиеллезом (лихорадка Ку) на двух административных территориях: в Сальском районе - 13 случаев (в т.ч. 8 - в г. Сальске) и Ремонтненском районе - 7 случаев и 1 случай заболевания туляриемией в Зимовниковском районе.

По поручению Управления в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» продолжено исследование иксодовых клещей на выявление патогенов. В пробах клещей, отобранных гг. Гуково, Зверево, Шахта, Аксайском, Октябрьском районах выявлены возбудители клещевых инфекций - иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) и гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ).

В комплекс профилактических мероприятий против инфекций, передающихся иксодовыми клещами, входят мероприятия по специфической профилактике (вакцинопрофилактика клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), туляремии, лихорадки Ку или экстренная профилактика иммуноглобулином КВЭ), экстренной антибиотикопрофилактике и неспецифической профилактике. Ростовская область не является эндемичной территорией по КВЭ.

К специфической профилактике туляремии среди людей относится иммунизация (вакцинация). Вакцинация против туляремии проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям населению, проживающему на неблагополучных (энзоотичных) по туляремии территориях, а также контингентам, подвергающимся риску заражения этой инфекцией (полевые и лесные работы, обработка меха, лабораторная работа с животными и материалом, подозрительным на инфицирование возбудителем туляремии и другие).

С целью снижения численности клещей в открытых стациях в области организованы противоклещевые обработки эпидзначимых участков; общая площадь акарицидных работ составила 9 307, 65 га, в том числе на территории детских образовательных учреждений - 1399,44 га. Управлением организовано выполнение контроля эффективности истребительных мероприятий, специалистами выборочно обследовано 7 765 га (83,43 %) от ранее обработанных площадей.

По данным управления ветеринарии Ростовской области первично обработано 100 % поголовья КРС и МРС; повторно - 733489 голов КРС и 509031 голов МРС.

Лучшим способом профилактики всех клещевых инфекций является предотвращение присасывания клещей!

После возвращения с прогулки следует провести полный осмотр тела и одежды. Следует помнить, что если клещи попадают на открытые части тела человека (кисти или предплечья рук, ноги), они редко присасываются на видимых местах, чаще клещи заползают под одежду и присасываются под ней. При этом клещи достаточно долго (в среднем 30 минут) выбирают место для присасывания. Можно успеть обнаружить клеща до того, как он начнет кровососание!

Как снять клеща?

Лучше всего это сделать у врача в травматологическом пункте.

При обращении за медицинской помощью по поводу присасывания клеща **медицинские работники**

собирают эпидемиологический анамнез, прививочный анамнез (в отношении КВЭ, туляремии, лихорадки Ку),

информируют о необходимости направления клеща в лабораторию для выявления возбудителей инфекционных болезней

, передающихся иксодовыми клещами, свойственных территории, с соблюдением требований биологической безопасности.

Куда можно сдать клеща на исследование?

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» по адресу; г. Ростов-на-Дону, ул. 7 линия, д. 67, к. 301 (режим работы с 9⁰⁰ до 16⁴⁰, тел. 8 (863) 275-74-18) проводится определение видового состава и дальнейшее исследование клещей, снятых с человека.

Если после укуса вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли необходимо срочно обратиться к врачу.

Чтобы уберечь себя от возможных заболеваний, используйте рекомендуемые советы, будьте внимательны при выходе на природу!