

Организация профилактических мероприятий по предупреждению возникновения и распространения клещевых инфекций

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области (далее – Управление) информирует, что в связи с благоприятными климатическими условиями в области отмечается активность иксодовых клещей.

На 05.04.2018 в лечебно-профилактические организации по поводу укуса клещами обратилось 47 человек, из них 16 – дети до 14 лет.

Управлением перед началом эпидсезона проведена корректировка объемов профилактических мероприятий (дератизационных и дезинсекционных), направленных на снижение эпизоотической активности природных очагов клещевых инфекций, включая барьерную дератизацию и дезинсекцию в населенных пунктах и зонах активных природных очагов.

На сегодняшний день противоклещевые работы эпидзначимых участков выполнены на общей площади 486,45 га, дератизация открытых стаций – 1923,40 га, мероприятия продолжаются.

В области организовано обязательное проведение контроля эффективности проводимых акарицидных обработок сельскохозяйственных животных и природных биотопов специалистами, прошедшими обучение по данному профилю (ветеринарные работники, зоологи, энтомологи).

С целью выявления мест локализации носителей и переносчиков природно-очаговых инфекций и своевременности выполнения истребительных мероприятий проводится эпизоотологическое обследование природных биотопов.

Управление обращает внимание в связи с приближающимся праздником Светлого Христова воскресенья (Пасхи), выходя на кладбища или любую территорию, где возможно встретить клещей, необходимо одеться таким образом, чтобы

предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей. Само и взаимоосмотры на предмет обнаружения клещей (в том числе ползущих сзади) необходимо проводить каждые 15 – 20 минут. Этот способ может существенно снизить риск присасывания клеща к телу, но полной гарантии он не дает. Необходимо соблюдать особую осторожность, садясь или ложась на траву, поскольку в этой ситуации клещ может прицепиться сразу к верхней части одежды или к голове и заметить его будет трудно.

Правильное применение специальных акарицидных или акарицидно-репеллентных средств обеспечивает наиболее высокий уровень защиты.

В случае укуса клещом, подъема температуры или других клинических проявлений необходимо немедленно обратиться к врачу и не заниматься самолечением!

Своевременно оказанное лечение - залог быстрого выздоровления и минимальных осложнений!